叶兴阳
双语音标有声读物
叶兴阳
双语音标
阅读创始人
注音阅
读英语
教育之父
English
注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 墨西哥蝙蝠已知分布范围的扩展(extensions Of Known Ranges Of Mexican Bats) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

墨西哥蝙蝠已知分布范围的扩展(Extensions of Known Ranges of Mexican Bats)

第1/1页

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz]
University of Kansas Publications
大学 的 堪萨斯州 出版物

堪萨斯大学出版社

[mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
Museum of Natural History
博物馆 的 自然的 历史

自然历史博物馆

['vɒljuːm] [naɪn] , [nəʊ] . [naɪn] , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 9 , No . 9 , pp . 347 - 351
体积 9 , 不 . 9 , pp . - - -

第9卷，第9期，第347-351页

['ɔːgəst] - , -
August 15 , 1956
八月 - , -

1956年8月15日

[ɛkst'ɛnʃənz] [ɒv; əv] [nəʊn] ['reɪndʒɪz]
Extensions of Known Ranges
扩展 的 已知 范围

已知范围的扩展

[ɒv; əv]['meksɪkən][bæts]
of Mexican Bats
的 墨西哥 蝙蝠

墨西哥蝙蝠

[baɪ]
BY
经过

经过

['sɪdni] ['ændəsn]
SYDNEY ANDERSON
悉尼 安德森

悉尼·安德森

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

Lawrence1956
Lawrence1956
Lawrence1956

劳伦斯1956

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz] , [mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
University of Kansas Publications , Museum of Natural History
大学 的 堪萨斯州 出版物 , 博物馆 的 自然的 历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

['editəz] : [iː] . ['reɪmənd] [hɔːl] , ['tʃeəmən] , [ə; eɪ] . ['baɪrən] ['lenəd] , ['rɒbət] ['dʌbljuː] . ['wɪlsn]
Editors : E . Raymond Hall , Chairman , A . Byron Leonard , Robert W . Wilson
编辑 : E . 雷蒙德 大厅 , 主席 , 一个 . 拜伦 伦纳德 , 罗伯特 W . 威尔逊

编辑：E·雷蒙德·霍尔（主席）、A·拜伦·伦纳德、罗伯特·W·威尔逊

['vɒljuːm] [naɪn] , [nəʊ] . [naɪn] , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 9 , No . 9 , pp . 347 - 351
体积 9 , 不 . 9 , pp . - - -

第9卷，第9期，第347-351页

['pʌblɪʃt] ['ɔːgəst] - , -
Published August 15 , 1956
已发布 八月 - , -

发表于1956年8月15日

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

['lɒrəns] , ['kænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州

堪萨斯州劳伦斯

['prɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过

印刷者

[fɜːrd] [vɔɪlənd] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . , [steɪt] ['prɪntə(r)]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机

FERD VOILAND, JR.，国家印刷商

[tə'piːkə] , KANSAS195626 - -
TOPEKA , KANSAS195626 - 4058
托皮卡 , KANSAS195626 - -

堪萨斯州托皮卡 195626-4058

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 349]
[页 -]

[第349页]

[ɛkst'ɛnʃənz] [ɒv; əv] [nəʊn] ['reɪndʒɪz]
Extensions of Known Ranges
扩展 的 已知 范围

已知范围的扩展

[ɒv; əv]['meksɪkən][bæts]
of Mexican Bats
的 墨西哥 蝙蝠

墨西哥蝙蝠

[baɪ]
BY
经过

经过

['sɪdni] ['ændəsn]
SYDNEY ANDERSON
悉尼 安德森

悉尼·安德森

[ˌɪnsɪ'dent(ə)l][tuː; tə] ['stʌdiz] [ɒv; əv][ˌspiːʃɪ'eɪʃ(ə)n; ˌspiːs-][ɒv; əv] [nɔːθ] [ə'merɪkən] ['mæm(ə)lz] ,
Incidental to studies of speciation of North American mammals ,
偶然的 到 研究 的 物种形成 的 北 美国人 哺乳动物 ,

在对北美哺乳动物物种形成进行研究的过程中,

[meɪd] ['pɒsəb(ə)l][baɪ] [ə'sɪstəns] [frɒm; frəm][ðə; ði]['næʃ(ə)nəl] ['saɪəns] [faʊn'deɪʃ(ə)n][ænd; ənd][ðə; ði]
made possible by assistance from the National Science Foundation and the
制成 可能的 经过 协助 从 这 国家的 科学 基础 和 这
['kænzəs][ˌjuːnɪ'vɜːsəti] [ɪn'daʊmənt] [əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn] ,
Kansas University Endowment Association ,
堪萨斯州 大学 捐赠基金 协会 ,

得益于美国国家科学基金会和堪萨斯大学捐赠协会的资助,这项研究得以实现。

[ə; eɪ]['nʌmbə(r)][ɒv; əv][bæts][hæv; həv] [biːn] ['teɪkən] [bɪ'jɒnd] [ðə; ði]['lɪmɪts][ɒv; əv][ðeə(r)] ['priːviəsli]
a number of bats have been taken beyond the limits of their previously
一个 数字 的 蝙蝠 有 到过 已采取 超过 这 限制 的 他们的 之前
[nəʊn] [ˌdʒiːə'græfɪk] ['reɪndʒɪz] .
known geographic ranges .
已知 地理 范围 .

许多蝙蝠已被捕获到其先前已知的地理分布范围之外。

['pendɪŋ] [ðə; ði] [kəm'pliːʃ(ə)n] [ɒv; əv][mɔː(r)] ['diːteɪld] ['fɔːnl] [ə'kaʊnts] ,
Pending the completion of more detailed faunal accounts ,
待办的 这 完成 的 更多的 详细的 动物 账户 ,

在更详细的动物群记录完成之前,

[ðiːz] [nəʊts] [ɑː(r); ə(r)] ['pʌblɪʃt] [səʊ] [ðæt] [ðə; ði] [ˌdɪstrɪ'bjuːʃənl] ['rekɔːdz] [wɪl] [biː; bi][ə'veɪləb(ə)l][tuː; tə]
these notes are published so that the distributional records will be available to
这些 笔记 是 已发布 所以 那 这 分布 记录 将要 是 可用的 到
['ɪntrəstɪd] ['stjʊdnts] [ɒv; əv]['meksɪkən] ['mæm(ə)lz] .
interested students of Mexican mammals .
感兴趣的 学生 的 墨西哥 哺乳动物 .

发表这些笔记是为了让对墨西哥哺乳动物感兴趣的学生能够查阅到这些分布记录。

['meni] [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts][ɑː(r); ə(r)] [ɪ'senʃəli] ['trɒpɪk(ə)l][ænd; ənd][ðə; ði] [njuː] ['rekɔːdz] [hɪə(r)] [rɪ'pɔːtɪd]
Many of these bats are essentially tropical and the new records here reported
许多 的 这些 蝙蝠 是 本质上 热带 和 这 新的 记录 这里 据报道
,
,
,

这些蝙蝠大多是热带蝙蝠,这里报告的新记录是:

[ɪk'stend][ðə; ði] [nəʊn] [ˌdʒiːə'græfɪk] ['reɪndʒɪz][tuː; tə][ðə; ði] ['nɔːθwəd] [ɒn]['aɪðə(r)][ðə; ði] [iːst] [ɔː(r)][ðə; ði]
extend the known geographic ranges to the northward on either the east or the
延长 这 已知 地理 范围 到 这 向北 在 任何一个 这 东方 或者 这
[west] [kəʊst] [ɒv; əv]['meksɪkəʊ] .
west coast of Mexico .
西方 海岸 的 墨西哥 .

将已知的地理范围向北扩展到墨西哥的东海岸或西海岸。

[kən'tɪnjuːd] [kə'lektɪŋ] ,
Continued collecting ,
持续 收集 ,

持续收集,

[ɪ'speʃəli] [baɪ][ðə; ði] [ɪn'tensɪv] [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ə; eɪ][və'raɪəti][ɒv; əv] ['meθədz] [ɪn'kluːdɪŋ] [ðə; ði][juːz]
especially by the intensive application of a variety of methods including the use
尤其 经过 这 密集的 应用 的 一个 种类 的 方法 包括 这 使用
[ɒv; əv] [mɪst] [nets] ,
of mist nets ,
的 薄雾 网 ,

特别是通过大量运用各种方法,包括使用雾网,

[ɪn][ðə; ði] ['nɔːðən] [pɑːts] [ɒv; əv][ðə; ði] [zəʊn] [ɒv; əv]['trɒpɪk(ə)l][ˌvedʒə'teɪʃ(ə)n][kæn; kən][biː; bi] [ɪk'spektɪd]
in the northern parts of the zone of tropical vegetation can be expected
在 这 北方 部分 的 这 区 的 热带 植被 能 是 预期的
[tuː; tə] [jiːld] ['ʌðə(r)] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv]['trɒpɪk(ə)l][bæts] [bɪ'jɒnd] [ðə; ði]['lɪmɪts][ɒv; əv][ðə; ði]['reɪndʒɪz] [naʊ]
to yield other species of tropical bats beyond the limits of the ranges now
到 屈服 其他 物种 的 热带 蝙蝠 超过 这 限制 的 这 范围 现在
[nəʊn] .
known .
已知 .

预计在热带植被带北部地区，将会发现目前已知分布范围之外的其他热带蝙蝠物种。

['kætəlɒg] ['nʌmbəz] ['saɪtɪd][ɪn] [pə'renθəsiːz] [ɑː(r); ə(r)] [ðəʊz] [ɒv; əv][ðə; ði][mjuˈziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]
Catalogue numbers cited in parentheses are those of the Museum of Natural
目录 数字 引用 在 括号 是 那些 的 这 博物馆 的 自然的
['hɪstri; 'hɪstəri] .
History .
历史 .

括号内所列的目录编号为自然历史博物馆的目录编号。

- - ['dɒbs(ə)n] . — [sɪks] ['spesəmən] (- - -) ['teɪkən]['sɛvən][miː] . ['dʌbljuː]
Chilonycteris psilotis Dobson . — Six specimens (36426 - 36431) taken 7 mi . W
- - 多布森 . — 六 标本 (- - -) 已采取 7 米 . W
[ænd; ənd] ½ [miː] . [es][ˌsænti:'eigəu] ,
and ½ mi . S Santiago ,
和 ½ 米 . S 圣地亚哥 ,

Chilonycteris psilotis Dobson.—六个标本（36426-36431）采集于圣地亚哥以西 7 英里和以南 ½ 英里处，

[æt; ət] [siː] ['lev(ə)l] , ['koʊləmə] , [baɪ][dʒeɪ] . [ɑː(r)] . ['ælˌkɔːrn] , [ɒn] [mɑːtʃ] - , - ,
at sea level , Colima , by J . R . Alcorn , on March 17 , 1950 ,
在 海 等级 , 科利马 , 经过 J . 拉 . 阿尔科恩 , 在 行进 - , - ,

1950年3月17日，JR Alcorn在科利马海平面拍摄的照片

[ɪk'stend][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] - [maɪlz] ['westwəd] [frɒm; frəm][ðə; ði][məʊst]
extend the known range of this species 330 miles westward from the most
延长 这 已知 范围 的 这 物种 - 英里 向西 从 这 最多
[ˈnɔːθ'westən] [rɪ'kɔːdɪd] [ə'kʌrəns] [æt; ət] - ,
northwestern recorded occurrence at Alpuyeca ,
西北 记录 发生 在 - ,

将该物种的已知分布范围从其在阿尔普耶卡（Alpuyeca）的最西北记录地点向西扩展 330 英里。

[mə'reɪlɑːs] (['deɪvɪs][ænd; ənd] ['rʌsəl] , - : -) .
Morelos (Davis and Russell , 1952 : 234) .
莫雷洛斯 (戴维斯 和 罗素 , - : -) .

莫雷洛斯（Davis 和 Russell，1952 年：234）。

[juːz][ɒv; əv][ðə; ði] [neɪm] - [ɪz] [ɪk'spleɪnd] [baɪ][diː][lɑː] ['tɔːri] (- : -) .
Use of the name psilotis is explained by de la Torre (1955 : 697) .
使用 的 这 姓名 - 是 解释 经过 德 拉 托雷 (- : -) .

de la Torre (1955: 697) 解释了 psilotis 这个名称的用法。

- - [ˌmɛksɪ'kɑːnə]['mɪlə(r)] . — [wʌn] ['spesɪmən] (-) [frɒm; frəm] - [miː] . ['dʌbljuː]
Chilonycteris parnellii mexicana Miller . — One specimen (54934) from 10 mi . W
- - 墨西哥人 磨坊主 . — 一 标本 (-) 从 - 米 . W
, [ˌtuː'tuː][miː] .
, 2 mi .
, 2 米 .

Chilonycteris parnellii mexicana Miller.—一个标本（54934），产自西10英里，2英里处。

[es][pi'eɪdrə] , - [ˌef 'tiː] . , [ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] , ['teɪkən][baɪ] [gəːd] [eɪtʃ] . ['haɪnrɪk] , [ɒn][dʒuːn] - ,
S Piedra , 1200 ft . , Tamaulipas , taken by Gerd H . Heinrich , on June 13 ,
S 皮耶德拉 , - 英尺 . , 塔毛利帕斯 , 已采取 经过 格尔德 H . 海因里希 , 在 六月 - ,

S Piedra，海拔1200英尺，塔毛利帕斯州，由Gerd H. Heinrich于6月13日拍摄。

- , [ɪk'stendz; ek-][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] - [maɪlz] [iːst] - [ˌnɔːθ'iːst] (['gʊdˌwɪn] , - :
1953 , extends the known range of this species 76 miles east - northeast (Goodwin , 1954 :
- , 扩展 这 已知 范围 的 这 物种 - 英里 东方 - 东北 (古德温 , - :

1953 年，该物种的已知分布范围向东北偏东方向扩展了 76 英里（Goodwin，1954 年：

[fɔːr]) , ['priːviəsli] [ðə; ði][məʊst] ['nɔːðən] [rɪ'kɔːdɪd] [ə'kʌrəns] [ɪn] [ˌnɔːθ'iːstən] ['meksɪkəʊ] .
4) , previously the most northern recorded occurrence in northeastern Mexico .
4) , 之前 这 最多 北方 记录 发生 在 东北部 墨西哥 .

4），此前在墨西哥东北部有记录的最北端的分布。

['θɜːti] ['ʌðə(r)] ['spesəmən] [hæv; həv] [biːn] ['teɪkən][frɒm; frəm][fɔː(r)] [ə'dɪʃən(ə)l] [ləu'kælitiz] [bɪ'twiːn] [el] - [ænd; ənd][ðə; ði] [pleɪs] - [miː] . ['dʌbljuː] ,
Thirty other specimens have been taken from four additional localities between El Pachón and the place 10 mi . W ,
三十 其他 标本 有 到过 已采取 从 四 额外的 地方 之间 埃尔 - 和 这 地方 - 米 . W ,

在埃尔帕琼和西边 10 英里处之间的另外四个地点，还采集了 30 个标本。

[ˌtuː'tuː][miː] . [es][pi'eɪdrə] .
2 mi . S Piedra .
2 米 . S 皮耶德拉 .

南皮耶德拉 2 英里。

- - ['fʊlvəs] (['tɒməs]) . — [ten] ['spesəmən] (- - -) [frɒm; frəm]['rɑːntʃəʊ] ['sæntə]['rəʊzə] , - [ˌkeɪ 'em] .
Pteronotus davyi fulvus (Thomas) . — Ten specimens (57525 - 57534) from Rancho Santa Rosa , 25 km .
- - 黄褐 (托马斯) . — 十 标本 (- - -) 从 牧场 圣诞老人 罗莎 , - 公里 .

Pteronotus davyi fulvus (Thomas)。—十个标本 (57525-57534)，来自兰乔圣罗莎，25 公里。

[en] , - [ˌkeɪ 'em] .
N , 13 km .
N , - 公里 .

北，13公里。

['dʌbljuː][ˌsiː 'diː] .
W Cd .
W 光盘 .

W Cd。

[vɪk'tɔːriə] , - ['miːtə(r)z] , [ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] , ['teɪkən][baɪ]['dʌbljuː] . - , [viː] . [^ri'siːnəj] , [ænd; ənd] [ɑː(r)] . ['grɪmzli] ,
Victoria , 260 meters , Tamaulipas , taken by W . Schaldach , V . Grissino , and R . Grimsley ,
维多利亚 , - 米 , 塔毛利帕斯 , 已采取 经过 W . - , V . 格里西诺 , 和 拉 . 格里姆斯利 ,

维多利亚，260 米，塔毛利帕斯州，由 W. Schaldach、V. Grissino 和 R. Grimsley 拍摄，

[frɒm; frəm][dɪ'sembə(r)] - , - , [tuː; tə]['dʒænjuəri][faɪv] , - ,
from December 26 , 1953 , to January 5 , 1954 ,
从 十二月 - , - , 到 一月 5 , - ,

从1953年12月26日至1954年1月5日，

[ɪk'stend][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] - [maɪlz] ['nɔːθwəd] [frɒm; frəm][ˌmɪrə'dɔː(r)] ,
extend the known range of this species 360 miles northward from Mirador ,
延长 这 已知 范围 的 这 物种 - 英里 向北 从 观景台 ,
[ˌverə'kruːz] (['deɪvɪs][ænd; ənd] ['rʌsəl] , - : -) .
Veracruz (Davis and Russell , 1952 : 235) .
韦拉克鲁斯 (戴维斯 和 罗素 , - : -) .

将该物种的已知分布范围从韦拉克鲁斯州米拉多尔向北扩展 360 英里（Davis 和 Russell，1952 年：235）。

[ə'nʌðə(r)] ['spesɪmən] [frɒm; frəm]
Another specimen from
其他 标本 从

另一个标本

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 350]
[页 -]

[第350页]

[ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs][ɪn]['aʊə(r)] [kə'lekʃ(ə)n] [ɪz][frɒm; frəm]['rɑːntʃəʊ]['pɑːnəu] - , [eit][miː] . [en]['goʊmɛz]
Tamaulipas in our collection is from Rancho Pano Ayuctle , 8 mi . N Gómez
塔毛利帕斯 在 我们的 收藏 是 从 牧场 全景 - , 8 米 . N 戈麦斯
- , - [fiːt] .
Fárias , 300 feet .
- , - 脚 .

我们收集的塔毛利帕斯州距离 Rancho Pano Ayuctle 8 英里。 N Gómez Fárias，300 英尺。

[glɑː'sɑːfəgə] - - ([greɪ]) . — [tuː] ['spesəmən] (- - -) [frɒm; frəm] - [miː] .
Glossophaga soricina leachii (Gray) . — Two specimens (54942 - 54943) from 16 mi .
舌食虫 - - (灰色的) . — 二 标本 (- - -) 从 - 米 .
['dʌbljuː] , [θriː][miː] . [es][pi'eɪdrə] ,
W , 3 mi . S Piedra ,
W , 3 米 . S 皮耶德拉 ,

索氏舌蝠（Glossophaga soricina leachii (Gray)）——两个标本（54942-54943）来自皮耶德拉以西 16 英里，以南 3 英里处。

[ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] , ['teɪkən][baɪ] [gɜːd] [eɪtʃ] . ['haɪnrɪk] , [ɒn][dʒuːn] - , - ,
Tamaulipas , taken by Gerd H . Heinrich , on June 15 , 1953 ,
塔毛利帕斯 , 已采取 经过 格尔德 H . 海因里希 , 在 六月 - , - ,

塔毛利帕斯，由格尔德·H·海因里希于1953年6月15日拍摄。

[ɪk'stend][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [ɒn][ðə; ði] [gʌlf] [kəʊst] [ɒv; əv]['meksɪkəʊ] ['nɔːθwəd] -
extend the known range of this species on the Gulf Coast of Mexico northward 60
延长 这 已知 范围 的 这 物种 在 这 海湾 海岸 的 墨西哥 向北 -
[maɪlz] [frɒm; frəm][faɪv][miː] . [ˌen 'iː][æn'tiːgwoʊ][mə'reɪlɑːs] ,
miles from 5 mi . NE Antiguo Morelos ,
英里 从 5 米 . 东北 古董 莫雷洛斯 ,

将该物种在墨西哥湾沿岸的已知分布范围向北扩展 60 英里，从安蒂瓜莫雷洛斯东北 5 英里处开始。

[nɪə(r)] [el] - , [ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] ([diː][lɑː] ['tɔːri] , - : -) .
near El Pachón , Tamaulipas (de la Torre , 1954 : 114) .
靠近 埃尔 - , 塔毛利帕斯 (德 拉 托雷 , - : -) .

塔毛利帕斯州 El Pachón 附近（de la Torre，1954：114）。

[ə'nʊrə] - - (['piːtəz]) . — [θriː] ['spesəmən] (- - -) [frɒm; frəm][ˌtuː'tuː]
Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters) . — Three specimens (36574 - 36576) from 2
阿诺拉 - - (彼得斯) . — 三 标本 (- - -) 从 2
[miː] . [ˌes'iː] - , - [ˌef 'tiː] . ,
mi . SE Jalcocotán , 3000 ft . ,
米 . 东南 - , - 英尺 . ,

Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters).—三个标本（36574-36576），产自 Jalcocotán 东南 2 英里，海拔 3000 英尺。

[ˌnɑːjɑːˈriːt] , [ðə; ði][fɜːst] [ˈrekɔːdz] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [steɪt] , [ˈteɪkən][baɪ][dʒeɪ] . [ɑː(r)] . [ˈælˌkɔːrn] , [ɒn] [ˈfebruəri] - ,
Nayarit , the first records for the state , taken by J . R . Alcorn , on February 15 ,
纳亚里特 , 这 第一的 记录 为了 这 状态 , 已采取 经过 J . 拉 . 阿尔科恩 , 在 二月 - ,

纳亚里特州的第一份记录由JR Alcorn于2月15日采集。

- , [ɪkˈstend][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] - [maɪlz] [ˈnɔːθwəd] [frɒm; frəm][sæn; sɑːn] - ,
1950 , extend the known range of the species 50 miles northward from San Sebástian ,
- , 延长 这 已知 范围 的 这 物种 - 英里 向北 从 圣 - ,

1950年，将该物种的已知分布范围从圣塞巴斯蒂安向北扩展了50英里。

[hɑːˈlɪskə] ([ˈsænbɔːn] , - : -) .
Jalisco (Sanborn , 1933 : 27) .
哈利斯科 (桑伯恩 , - : -) .

哈利斯科（Sanborn，1933：27）。

- [ˌmɛksɪˈkɑːnə] [ˈtʃuːdiː] . — [θriː] [ˈspesəmən] (- - -) [frɒm; frəm][fɔːr][ˌkeɪ ˈem] .
Choeronycteris mexicana Tschudi . — Three specimens (60176 - 60178) from 4 km :
- 墨西哥人 tschudi . — 三 标本 (- - -) 从 4 公里 .

墨西哥拟鲿（Choeronycteris mexicana Tschudi.）—来自 4 公里处的三个标本（60176-60178）。

[en][ˈdʒɔɪə] [vəːd] , [nɪə(r)] - , - [ˌef ˈtiː] . , [ˌtɑːmɑːuˈliːpɑːs] , [ˈteɪkən][baɪ][ˈdʌbljuː] . - , [ɒn][dʒʊˈlaɪ] - ,
N Joya Verde , near Huisachal , 4000 ft . , Tamaulipas , taken by W . Schaldach , on July 17 ,
N 乔雅 维德 , 靠近 - , - 英尺 . , 塔毛利帕斯 , 已采取 经过 W . - , 在 七月 - ,

N Joya Verde，位于 Huisachal 附近，海拔 4000 英尺，塔毛利帕斯州，由 W. Schaldach 于 7 月 17 日拍摄。

- , [ɪkˈstend][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] [ˈspiːʃiːz] [ˈiːstwəd] [ˈɪntuː][ðə; ði] [steɪt] [ɒv; əv] [ˌtɑːmɑːuˈliːpɑːs] .
1954 , extend the known range of this species eastward into the state of Tamaulipas .
- , 延长 这 已知 范围 的 这 物种 向东 进入 这 状态 的 塔毛利帕斯 .

1954 年，将该物种的已知分布范围向东扩展到塔毛利帕斯州。

[ˈiːstən] [ˈmɑːdʒɪn(ə)l] [ˈrekɔːdz] [ɪn] [ˌnɔːθˈiːstən] [ˈmeksɪkəʊ][wɜː(r); wə(r)][wʌn][miː] . [es][ænd; ənd][fɔːr][miː] . [ˈdʌbljuː] [ˈbelə] [ˌuːˈnjon] ,
Eastern marginal records in northeastern Mexico were 1 mi . S and 4 mi . W Bella Unión ,
东 边缘 记录 在 东北部 墨西哥 是 1 米 . S 和 4 米 . W 贝拉 联盟 ,

墨西哥东北部的东部边缘记录为 1 英里。 S 和 4 英里。 W 贝拉联盟，

- [ˌef ˈtiː] . , [ˌkoʊəˈwiːlə] ([ˈbeɪkə(r)] , - : -) , [ænd; ənd][ˌhæsiˈendə] - , [sæn; sɑːn][ˈlwis; ˈlwiʃ] [pəˈtoʊsiː] ([dælkwɛst] , - : -) .
7000 ft . , Coahuila (Baker , 1956 : 174) , and Hacienda Capulín , San Luis Potosí (Dalquest , 1953 : 27) .
- 英尺 . , 科阿韦拉 (贝克 , - : -) , 和 庄园 - , 圣 路易斯 波托西 (达尔奎斯特 , - : -) .

7000 英尺，科阿韦拉州（Baker，1956：174）和圣路易斯波托西州卡普林庄园（Dalquest，1953：27）。

[sɛn'tʊrioʊ]['si:nɛks] [greɪ] . — [wʌn] ['spesɪmən] (-) [frɒm; frəm] - [mi:] . ['dʌblju:] , [θri:][mi:] .
Centurio senex Gray . — One specimen (54958) from 14 mi . W , 3 mi .
百夫长 senex 灰色的 . — 一 标本 (-) 从 - 米 . W , 3 米 .

Centurio senex Grey。——来自 14 英里的一个标本 (54958)。西，3 英里。

[es][pi'eɪdrə] , [ˌtɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] , [ɪk'stendz; ek-][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv][ðə; ði] ['spi:ʃi:z] - [maɪlz]
S Piedra , Tamaulipas , extends the known range of the species 58 miles
S 皮耶德拉 , 塔毛利帕斯 , 扩展 这 已知 范围 的 这 物种 - 英里
['nɔ:θwəd] [frɒm; frəm]['pɑ:nəu] - ,
northward from Pano Ayuctle ,
向北 从 全景 - ,

塔毛利帕斯州的S Piedra将该物种的已知分布范围向北延伸了58英里，从Pano Ayuctle向北延伸了58英里。

[nɪə(r)]['goʊmɛz] - , [ˌtɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] ([di:][lɑ:] ['tɔ:ri] , - : -) .
near Gómez Fárias , Tamaulipas (de la Torre , 1954 : 114) .
靠近 戈麦斯 - , 塔毛利帕斯 (德 拉 托雷 , - : -) .

塔毛利帕斯州戈麦斯·法里亚斯附近（de la Torre，1954：114）。

- [ˌmɛksɪ'kɑ:nəs] - [dælkwɛst] [ænd; ənd] [hɔ:l] . — [tu:] ['spesəmən] (- - -)
Natalus mexicanus saturatus Dalquest and Hall . — Two specimens (54999 - 55000)
- 墨西哥人 - 达尔奎斯特 和 大厅 . — 二 标本 (- - -)
[frɒm; frəm][ðə; ði] [si'erə] [di:][ˌtɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] ,
from the Sierra de Tamaulipas ,
从 这 塞拉 德 塔毛利帕斯 ,

Natalus mexicanus saturatus Dalquest 和 Hall。——来自塔毛利帕斯山脉的两个标本 (54999-55000)，

- [mi:] . ['dʌblju:] , [θri:][mi:] . [es][pi'eɪdrə] , [ˌtɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] , ['teɪkən][baɪ] [gə:d] [eɪtʃ] . ['haɪnrɪk] ,
14 mi . W , 3 mi . S Piedra , Tamaulipas , taken by Gerd H . Heinrich ,
- 米 . W , 3 米 . S 皮耶德拉 , 塔毛利帕斯 , 已采取 经过 格尔德 H . 海因里希 ,

位于塔毛利帕斯州皮耶德拉以西 14 英里，以南 3 英里处，由 Gerd H. Heinrich 拍摄。

[ɒn][dʒu:n] - , - , [ɪk'stend][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] ['spi:ʃi:z] - [maɪlz] ['nɔ:θwəd]
on June 12 , 1953 , extend the known range of this species 61 miles northward
在 六月 - , - , 延长 这 已知 范围 的 这 物种 - 英里 向北
[frɒm; frəm] [el] - ,
from El Pachón ,
从 埃尔 - ,

1953年6月12日，将该物种的已知分布范围从埃尔帕琼向北扩展了61英里。

[ˌtɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] (['gʊdˌwɪn] , - : [faɪv]) .
Tamaulipas (Goodwin , 1954 : 5) .
塔毛利帕斯 (古德温 , - : 5) .

塔毛利帕斯（Goodwin，1954：5）。

['fɔ:ti] - [wʌn]['ʌðə(r)] ['spesəmən] [hæv; həv] [bi:n] ['teɪkən][frɒm; frəm] [θri:] [ləu'kælitiz] [bɪ'twi:n] [el]
Forty - one other specimens have been taken from three localities between El
四十 - 一 其他 标本 有 到过 已采取 从 三 地方 之间 埃尔
- [ænd; ənd][ðə; ði] [nju:] ['rekɔ:d; rɪ'kɔ:d]['steɪʃ(ə)n] ['menʃ(ə)nd] [ə'bʌv] .
Pachón and the new record station mentioned above .
- 和 这 新的 记录 车站 提及 多于 .

在埃尔帕琼和上述新记录站之间的三个地点，还采集到了另外 41 个标本。

- ['pɑ:rvjʊlə]['tu:mɪdə][eɪtʃ] . ['ælən] . — [wʌn] ['spesɪmən] (-) [frɒm; frəm][fɔ:r][mi:] .
Rhogeëssa parvula tumida H . Allen . — One specimen (55192) from 4 mi .
- 小 肿胀 H . 艾伦 . — 一 标本 (-) 从 4 米 .

Rhogeëssa parvula tumida H. Allen.——来自 4 英里的一个标本 (55192)。

[en][lɑ:]['pɛskə] , [ˌtɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] , ['teɪkən][baɪ] [gə:d] [eɪtʃ] . ['haɪnrɪk] , [ɒn] [meɪ] - , - ,
N La Pesca , Tamaulipas , taken by Gerd H . Heinrich , on May 24 , 1953 ,
N 拉 佩斯卡 , 塔毛利帕斯 , 已采取 经过 格尔德 H . 海因里希 , 在 可能 - , - ,

塔毛利帕斯州 N La Pesca，由 Gerd H. Heinrich 于 1953 年 5 月 24 日拍摄，

[ɪk'stendz; ek-][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv][ðə; ði] ['spiːʃiːz] [ɒn][ðə; ði] [iːst] [kəʊst][ɒv; əv]['meksɪkəʊ]
extends the known range of the species on the east coast of Mexico
扩展 这 已知 范围 的 这 物种 在 这 东方 海岸 的 墨西哥
['nɔːθwəd] - [maɪlz][frɒm; frəm] - [ˌkeɪˌem'ɛs] .
northward 115 miles from 10 kms .
向北 - 英里 从 - 公里 .

该物种在墨西哥东海岸的已知分布范围向北扩展了 115 英里，从 10 公里扩展至 10 公里。

[ˌdʌbljuː 'es 'dʌbljuː] - , [ˌverə'kruːz] ([dælkwɛst] , - : -) , [ænd; ənd]['ɔːlsəʊ] [ˌnɔːθ'iːstwəd] -
WSW Ebano , Veracruz (Dalquest , 1953 : 58) , and also northeastward 115
西南偏西 - , 韦拉克鲁斯 (达尔奎斯特 , - : -) , 和 还 向东北方向 -
[maɪlz][frɒm; frəm]['sæntə]['mærɪə] ,
miles from Santa Maria ,
英里 从 圣诞老人 玛丽亚 ,

韦拉克鲁斯州西西南埃巴诺 (Dalquest, 1953: 58)，距圣玛丽亚东北 115 英里，

[ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] (['gʊdˌwɪn] , - : [sɪks]) .
Tamaulipas (Goodwin , 1954 : 6) .
塔毛利帕斯 (古德温 , - : 6) .

塔毛利帕斯（Goodwin，1954：6）。

[ə'nʌðə(r)] [njuː] ['mɑːdʒɪn(ə)l][ləʊ'kæləti][fɔː(r); fə(r)] [ðɪs] ['spiːʃiːz] , [ˌreprɪ'zentɪd] [baɪ] - ['spesəmən] [ɪn]
Another new marginal locality for this species , represented by 39 specimens in
其他 新的 边缘 地点 为了 这 物种 , 代表 经过 - 标本 在
['aʊə(r)] [kə'lekʃ(ə)n] ,
our collection ,
我们的 收藏 ,

我们收藏的标本中有 39 个代表该物种，这是该物种的另一个新边缘分布区。

[ɪz] - [miː] . ['dʌbljuː] , [ˌtuː'tuː][miː] . [es][pi'eɪdrə] , - [ˌef 'tiː] . , [ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] .
is 10 mi . W , 2 mi . S Piedra , 1200 ft . , Tamaulipas .
是 - 米 . W , 2 米 . S 皮耶德拉 , - 英尺 . , 塔毛利帕斯 .

位于 Piedra 以西 10 英里，以南 2 英里，海拔 1200 英尺，塔毛利帕斯州。

- - (['tɒməs]) . — [ə; eɪ] ['spesɪmən] (-) [frɒm; frəm][sɪks][miː] . ['dʌbljuː][ænd; ənd]
Baeodon alleni (Thomas) . — A specimen (68773) from 6 mi . W and
- - (托马斯) . — 一个 标本 (-) 从 6 米 . W 和
[ˌtuː'tuː][miː] . [en] ,
2 mi . N Nejapa ,
2 米 . N 内贾帕 ,

艾伦氏贝奥顿龙（托马斯）——标本（68773）产自内贾帕以西 6 英里、以北 2 英里处。

[wə'hɑːkə] , ['teɪkən][baɪ][ə; eɪ] . [ə; eɪ] . ['ælˌkɔːrn] , [ɒn] ['ɔːgəst] [sɪks] ,
Oaxaca , taken by A . A . Alcorn , on August 6 ,
瓦哈卡 , 已采取 经过 一个 . 一个 . 阿尔科恩 , 在 八月 6 ,

瓦哈卡，由AA Alcorn于8月6日拍摄。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 351]
[页 -]

[第351页]

- , [ɪk'stendz; ek-][ðə; ði] [nəʊn] [reɪndʒ][ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [ˌsaʊθ'iːstwəd] - [maɪlz][frɒm; frəm]
1955 , extends the known range of this species southeastward 100 miles from
- , 扩展 这 已知 范围 的 这 物种 东南 - 英里 从
- ,
Cuicatlán ,
- ,

1955 年，该物种的已知分布范围从 Cuicatlán 向东南方向扩展了 100 英里。

- ['miːtə(r)z] , [wə'hɑːkə] ([hɔːl] , - : [ˌtuː'tuː]) .
590 meters , Oaxaca (Hall , 1955 : 2) .
- 米 , 瓦哈卡 (大厅 , - : 2) .

590 米，瓦哈卡（Hall，1955：2）。

[ʌn'tɪl] ['riːs(ə)ntli] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [wɒz; wəz] [nəʊn] [frɒm; frəm][ðə; ði] [taɪp] [ləʊ'kæləti]['əʊnli] .
Until recently this species was known from the type locality only .
直到 最近 这 物种 曾是 已知 从 这 类型 地点 仅有的 .

直到最近，人们才开始了解这个物种，此前只知道它分布于模式产地。

[læsː'ʊrɪs] [ˌbɔːri'eɪlɪs][ɔːr'neɪtəs] [hɔːl] . — [ˌsɪks'tiːn] ['spesəmən] (- - -) [frɒm; frəm][nɪə(r)][pi'eɪdrə]
Lasiurus borealis ornatus Hall . — Sixteen specimens (55325 - 55340) from near Piedra
拉西乌鲁斯 北方 装饰 大厅 . — 十六 标本 (- - -) 从 靠近 皮耶德拉

, - [tuː; tə] - [ˌef 'tiː] . ,
, 1200 to 1400 ft . ,
, - 到 - 英尺 . ,

饰纹北极蝙蝠（Lasiurus borealis ornatus Hall.）—16个标本（55325-55340）产自皮耶德拉附近，海拔1200至1400英尺。

[ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] ([wʌn][frɒm; frəm] - [miː] . ['dʌbljuː] , [ˌtuː'tuː][miː] . [es] ; [wʌn][frɒm; frəm] - [miː] . ['dʌbljuː] ,
Tamaulipas (1 from 10 mi . W , 2 mi . S ; 1 from 14 mi . W ,
塔毛利帕斯 (1 从 - 米 . W , 2 米 . S ; 1 从 - 米 . W ,

塔毛利帕斯（1号公路位于西10英里，南2英里处；1号公路位于西14英里处，

[θriː][miː] . [es] ; [ænd; ənd] - [frɒm; frəm] - [miː] . ['dʌbljuː] ,
3 mi . S ; and 14 from 16 mi . W ,
3 米 . S ; 和 - 从 - 米 . W ,

南 3 英里；西 16 英里处 14 英里，

[θriː][miː] . [es][pi'eɪdrə]) [tend] [tuː; tə] [fɪl] [ə; eɪ][gæp][ɪn][ðə; ði] [nəʊn] [ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] .
3 mi . S Piedra) tend to fill a gap in the known distribution of this species .
3 米 . S 皮耶德拉) 趋向 到 充满 一个 差距 在 这 已知 分配 的 这 物种 .

3 英里（南皮耶德拉）往往填补了该物种已知分布范围的空白。

['priːviəsli] [ˌaɪ 'tiː][wɒz; wəz] [nəʊn] [frɒm; frəm][ˌmætə'mɔːrəs] , [ˌtɑːmɑːu'liːpɑːs] (['mɪlə(r)] , - : -) ,
Previously it was known from Matamoros , Tamaulipas (Miller , 1897 : 108) ,
之前 它 曾是 已知 从 马塔莫罗斯 , 塔毛利帕斯 (磨坊主 , - : -) ,

[tuː; tə][ðə; ði] [nɔːθ] [ænd; ənd][frɒm; frəm] - ,
to the north and from Bledos ,
到 这 北 和 从 - ,

此前人们只知道它分布在北部的塔毛利帕斯州马塔莫罗斯（Mattamoros, Tamaulipas）（Miller，1897：108）和布莱多斯（Bledos）。

[sæn; sɑːn]['lwis; 'lwiʃ][pə'toʊsiː] ([dælkwɛst] , - : -) , [tuː; tə][ðə; ði] [saʊθ] .
San Luis Potosí (Dalquest , 1953 : 61) , to the south .
圣 路易斯 波托西 (达尔奎斯特 , - : -) , 到 这 南 .

圣路易斯波托西（Dalquest，1953：61），在南部。

[ə'saɪnmənt] [tuː; tə][ðə; ði] ['sʌbspiːʃiːz] [el] . [biː] . [ɔːr'neɪtəs][ɪz] ['tentətɪv] [ænd; ənd][ɪz] [beɪst] [praɪ'merəli]
Assignment to the subspecies L . b . ornatus is tentative and is based primarily
任务 到 这 亚种 L . b . 装饰 是 暂定的 和 是 基于 主要

[ɒn][ðə; ði]['skænti]['kʌvə(r)][ɒv; əv][heə(r)] [tə'wɔːd] [ðə; ði]['mɑːdʒɪn][ɒv; əv][ðə; ði] [ˌɪntə'femərəl] ['membreɪn]
on the scanty cover of hair toward the margin of the interfemoral membrane
在 这 稀少 覆盖 的 头发 朝向 这 利润 的 这 股间 膜

[ænd; ənd]['skænti]['kʌvə(r)][ɒv; əv][heə(r)][ɒn][ðə; ði] ['ventrəl] ['sɜːfɪs] [ɒv; əv][ðə; ði] ['membreɪn] [ə'lɒŋ] [ðə; ði]
and scanty cover of hair on the ventral surface of the membrane along the
和 稀少 覆盖 的 头发 在 这 腹侧 表面 的 这 膜 沿着 这

['fɔːrɑːm] .
forearm .
前臂 .

将其归类为亚种 L. b. ornatus 尚属暂定，主要依据是股间膜边缘毛发稀疏以及前臂膜腹面毛发稀疏。

['ædɪkwət] [kəm'pærətɪv] [mə'tɪəriəl][ɒv; əv][el] . [biː] . [ɔːr'neɪtəs][frɒm; frəm] ['sʌðən] ['meksɪkəʊ][ɪz][nɒt]
Adequate comparative material of L . b . ornatus from southern Mexico is not
足够的 比较 材料 的 L . b . 装饰 从 南部 墨西哥 是 不是
[ə'veɪləb(ə)l] .
available .
可用的 .

目前尚无来自墨西哥南部的 L. b. ornatus 的足够对比材料。

['lɪtrətʃə(r); 'lɪtərətʃə] ['saɪtɪd]
LITERATURE CITED
文学 引用

参考文献

['beɪkə(r)] , [ɑː(r)] . [eɪtʃ] . - .
Baker , R . H . 1956 .
贝克 , 拉 . H . - .

Baker，RH1956。

[ðə; ði] ['mæm(ə)lz] [ɒv; əv][ˌkoʊə'wiːlə] .
The Mammals of Coahuila .
这 哺乳动物 的 科阿韦拉 .

科阿韦拉州的哺乳动物。

['juːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

['kænzəs] [pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , Mus .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .

堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [naɪn] : - - - , - [fɪgz] .
Hist . , 9 : 125 - 335 , 75 figs .
历史 . , 9 : - - - , - 无花果 .

历史，9：125-335，75 图。

[ɪn][tekst] , [dʒuːn] - .
in text , June 15 .
在 文本 , 六月 - .

文本日期：6月15日。

[dælkwɛst] , ['dʌbljuː] . ['dʌbljuː] . - .
Dalquest , W . W . 1953 .
达尔奎斯特 , W . W . - .

Dalquest，WW1953。

['mæm(ə)lz] [ɒv; əv][ðə; ði]['meksɪkən] [steɪt] [ɒv; əv][sæn; sɑːn]['lwis; 'lwiʃ][pə'toʊsiː] .
Mammals of the Mexican State of San Luis Potosí .
哺乳动物 的 这 墨西哥 状态 的 圣 路易斯 波托西 .

墨西哥圣路易斯波托西州的哺乳动物。

[luˌiːzi'ænə] [steɪt] ['juːnɪv] .
Louisiana State Univ .
路易斯安那州 状态 大学 .

路易斯安那州立大学

['stʌdiz] , ['baɪəl] .
Studies , Biol .
研究 , 生物学 .

研究，生物学。

['saɪ] .
Sci .
科学 .

科学。

[sɪə] . , [nəʊ] . [wʌn] : [wʌn] - - , [dɪ'sembə(r)] - .
Ser . , No . 1 : 1 - 233 , December 28 .
ser . , 不 . 1 : 1 - - , 十二月 - .

系列，第 1 期：1-233，12 月 28 日。

['deɪvɪs] , ['dʌblju:] . [bi:] . , [ænd; ənd][ɑ:(r)] . [dʒeɪ] . Russell1952 .
Davis , W . B . , and R . J . Russell1952 .
戴维斯 , W . B . , 和 拉 . J . Russell1952 .

Davis, WB 和 RJ Russell1952。

[bæts][ɒv; əv][ðə; ði]['meksɪkən] [steɪt] [ɒv; əv][mə'reɪlɑ:s] .
Bats of the Mexican state of Morelos .
蝙蝠 的 这 墨西哥 状态 的 莫雷洛斯 .

墨西哥莫雷洛斯州的蝙蝠。

[dʒɜ:(r)] .
Jour .
一天 .

期刊

['mæm] . , - : - - - , [meɪ] - .
Mamm . , 33 : 234 - 239 , May 16 .
乳房 . , - : - - - , 可能 - .

Mamm., 33: 234-239, 5月16日。

[di:][lɑ:] ['tɔ:ri] , [el] . - .
de la Torre , L . 1954 .
德 拉 托雷 , L . - .

德拉托雷，L.1954。

[bæts][frɒm; frəm] ['sʌðən] [,tɑ:mɑ:u'li:pɑ:s] , ['meksɪkəʊ] .
Bats from southern Tamaulipas , Mexico .
蝙蝠 从 南部 塔毛利帕斯 , 墨西哥 .

来自墨西哥塔毛利帕斯州南部的蝙蝠。

[dʒɜ:(r)] . ['mæm] . , - : - - - , [meɪ] - . - .
Jour . Mamm . , 35 : 113 - 116 , May 26 . 1955 .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 可能 - . - .

日记。 Mamm.，35：113-116，1955 年 5 月 26 日。

[bæts][frɒm; frəm] [gɛ'rɛroʊ] , [hɑ:'lɪskə][ænd; ənd][wə'hɑ:kə] , ['meksɪkəʊ] .
Bats from Guerrero , Jalisco and Oaxaca , Mexico .
蝙蝠 从 格雷罗 , 哈利斯科 和 瓦哈卡 , 墨西哥 .

来自墨西哥格雷罗州、哈利斯科州和瓦哈卡州的蝙蝠。

[,fi:ldi'ænə] : [zu'ɒlədʒi] , - : - - - , [,tu:'tu:] [pleɪts] , [dʒu:n] - .
Fieldiana : Zoology , 37 : 695 - 703 , 2 plates , June 19 .
菲尔迪亚纳 : 动物学 , - : - - - , 2 盘子 , 六月 - .

Fieldiana：动物学，37：695-703，2 张图版，6 月 19 日。

['gʊd,wɪn] , [dʒi:] . [dʒi:] . - .
Goodwin , G . G . 1954 .
古德温 , G . G . - .

古德温，GG1954。

['mæm(ə)lz] [frɒm; frəm]['meksɪkəʊ] [kə'lektɪd] [baɪ]['meəriən]['mɑːtɪn] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [ə'merɪkən] [mju'ziːəm]
Mammals from Mexico collected by Marian Martin for the American Museum
哺乳动物 从 墨西哥 集 经过 玛丽安 马丁 为了 这 美国人 博物馆
[ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri] .
of Natural History .
的 自然的 历史 .

玛丽安·马丁为美国自然历史博物馆收集的墨西哥哺乳动物标本。

[ə'merɪkən] [mʌs] .
American Mus .
美国人 音乐 .

美国博物馆

[noʊvɪt] . , - : [wʌn] - - , [nəʊ'vembə(r)] - .
Novit . , 1689 : 1 - 16 , November 12 .
诺维特 . , - : 1 - - , 十一月 - .

1689年十一月：11月12日1-16日。

[hɔːl] , [iː] . [ɑː(r)] . - .
Hall , E . R . 1955 .
大厅 , E . 拉 . - .

Hall，ER1955。

['nweɪvoʊs][ˌmɜːrsi'eɪləgoʊz]['pærə][lɑː] ['fɔːnə] [ˌmɛksɪ'kɑːnə] .
Nuevos murciélagos para la fauna Mexicana .
新 蝙蝠 帕拉 拉 动物 墨西哥 .

Nuevos murciélagos para la fauna Mexicana。

['æktə] [zuːl] .
Acta Zool .
Acta 动物学 .

动物学报

[ˌmɛksɪ'kɑːnə] , [wʌn] ([nəʊ] .
Mexicana , 1 (No .
墨西哥 , 1 (不 .

Mexicana，1（第 1 期）

[θriː]) : [wʌn] - [ˌtuː'tuː] , [sep'tembə(r)] - .
3) : 1 - 2 , September 10 .
3) : 1 - 2 , 九月 - .

3): 9 月 10 日 1-2 日。

['mɪlə(r)] , [dʒiː] . [es] . , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . - .
Miller , G . S . , Jr . 1897 .
磨坊主 , G . S . , 小 . - .

米勒，GS，小，1897。

[rɪ'vɪʒ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [nɔːθ] [ə'merɪkən] [bæts][ɒv; əv][ðə; ði]['fæməli] [ˌvespə'tailiənəid:] .
Revision of the North American bats of the family Vespertilionidae .
修订 的 这 北 美国人 蝙蝠 的 这 家庭 蝙蝠科 .

北美蝙蝠科蝙蝠的修订。

[en] . ['æmər] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

['fɔːnə] , - : [wʌn] - - , [ɒk'təʊbə(r)] - .
Fauna , 13 : 1 - 135 , October 16 .
动物群 , - : 1 - - , 十月 - .

动物志，13：1-135，10月16日。

['sænbɔːn] , [siː] . [siː] . - .
Sanborn , C . C . 1933 .
桑伯恩 , C . C . - .

Sanborn，CC1933。

[bæts][ɒv; əv][ðə; ði]['dʒenərə] [ə'nʊrə] [ænd; ənd] - .
Bats of the genera Anoura and Lonchoglossa .
蝙蝠 的 这 属 阿诺拉 和 - .

属于无尾蝠属和长舌蝠属的蝙蝠。

[zuːl] .
Zool .
动物学 .

动物学。

[sɪə] . , [fiːld] [mʌs] .
Ser . , Field Mus .
ser . , 场地 音乐 .

系列，菲尔德博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , ['eks 'eks] : - - - , [dɪ'sembə(r)] - .
Hist . , XX : 23 - 28 , December 11 .
历史 . , xx : - - - , 十二月 - .

历史，XX：23-28，12月11日。

[trænz'mɪtɪd] [meɪ] - , - . - - -
Transmitted May 12 , 1956 . 26 - 4058
传输 可能 - , - . - - -

1956年5月12日发送。26-4058

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

开口如有神
听书破万卷